



Inicia la conversación.

Es importante hablar con tu doctor sobre el riesgo de contraer la neumonía neumocócica y de cómo puedes ayudar a protegerte.

Lleva esta guía a tu siguiente cita médica o visita a la farmacia y pregunta si PREVNAR 13® es adecuada para ti.

¿Estoy en riesgo de contraer la neumonía neumocócica?

Adultos de 65 años o más tienen **más de 10 veces de probabilidad** de ingresar al hospital con neumonía neumocócica que los adultos menores de 50 años de edad.

Otros factores, como el estilo de vida y ciertas afecciones crónicas de salud como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), el asma, la enfermedad cardíaca y la diabetes, pueden incrementar aún más el riesgo de contraer la neumonía neumocócica.

¿Es PREVNAR 13® adecuada para mí?

Los CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades) recomiendan que los adultos de 65 años de edad o mayores reciban la vacuna PREVNAR 13® para ayudar a protegerse de la enfermedad neumocócica.

¿Mi seguro cubrirá el costo de PREVNAR 13®?

- Si tienes 65 años o más, la parte B de Medicare cubre PREVNAR 13® y puede estar disponible con **\$0 costo de tu bolsillo**. Habla con tu doctor o farmacéutico sobre tu cobertura.
- Si eres un adulto menor de 65 años de edad, verifica con tu proveedor de seguro.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD


- No se debe dar Plevnar 13® a ninguna persona con un historial de reacción alérgica grave a cualquier componente de Plevnar 13® o de cualquier vacuna que contenga el toxoide diftérico.
- Puede ser que adultos con sistemas inmunológicos debilitados (ejemplo: infección de VIH, leucemia) tengan una respuesta inmune reducida.
- En adultos, los efectos secundarios más comunes fueron dolor, enrojecimiento e hinchazón en el área de la inyección, limitación del movimiento del brazo, fatiga, dolor de cabeza, dolor en los músculos, dolor en las coyunturas, apetito disminuido, vómito, fiebre, escalofríos y erupción.
- Pregúntale a tu proveedor de salud sobre los riesgos y beneficios de Plevnar 13®. Solo un proveedor de salud puede decidir si Plevnar 13® es adecuada para ti.

Los pacientes siempre deberían pedir consejo médico sobre eventos adversos a sus doctores. Se te aconseja reportar los efectos secundarios negativos de las vacunas a la Administración de Medicamentos y Alimentos de los EE. UU. (FDA, por sus siglas en inglés) y a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). Visita <http://www.vaers.hhs.gov> o llama al 1-800-822-7967.

Por favor, ve la [Información para la prescripción](#).

INDICACIONES PARA PREVNAR 13®

- Plevnar 13® es una vacuna aprobada para adultos de 18 años de edad y mayores para la prevención de la neumonía neumocócica y la enfermedad invasiva causada por 13 cepas de *Streptococcus pneumoniae* (1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F y 23F).
- Plevnar 13® no es 100% efectiva y solo ayudará a proteger contra las 13 cepas incluidas en la vacuna.

 PREVNAR 13 es una marca registrada de Wyeth LLC. Fabricado por Wyeth Pharmaceuticals Inc. Comercializado por Pfizer Inc.

PP-PNA-USA-3017-02 © 2018 Pfizer Inc. Todos los derechos reservados. Diciembre del 2018

Por favor, lee nuestra [Política de privacidad](#) y los [Términos de uso](#).

La información del producto en este sitio está planeada solo para residentes de los Estados Unidos. Los productos aquí mencionados pueden tener diferentes etiquetados en distintos países.

La información de salud contenida aquí se ofrece para propósitos educativos y no tiene el objetivo de sustituir pláticas con un proveedor de salud. Todas las decisiones respecto al cuidado del paciente deben tomarse junto con un proveedor de salud, considerando las características individuales de cada paciente.